

**Q** 만성질환이 있는 경우 오셀타미비르 투여는 어떻게 하나요?


**A** 만성질환 환자도 오셀타미비르를 복용할 수 있으나, 의사에게 미리 알려야 합니다.  
신기능 저하 환자는 투여 용량 조절이 필요합니다.  
복용한 사람에서 간 효소치의 상승이 나타날 수 있으므로 간질환 환자의 경우 의사와 상의하여야 합니다.  
당뇨 환자의 경우 고혈당증이 보고된 바 있으므로 주의가 필요합니다.

**Q** 오셀타미비르를 복용하더라도 증상이 계속되는 경우는 어떻게 하나요?

**A** 다른 원인이 있을 수 있으므로 의사와 상담해야 합니다.

**Q** 오셀타미비르 복용을 잊었을 때는 어떻게 하나요?

**A** 제 시간에 약을 복용하지 못한 경우 다음 복용 시간이 2시간 이상 남았으면 가능한 빨리 누락된 용량을 복용하여야 하며, 이후 일정 시간에 복용해야 합니다.



## 의약품 부작용이 발생하면?

의약품을 복용한 후 부작용이 의심되면 의사 또는 약사와 상담한 후  
한국의약품안전관리원으로 보고해주세요.  
국민 여러분의 보고자료는 부작용 예방대책을 마련하는 밑거름이 됩니다.





## 의약품 부작용 보고 방법은?

- ☎ 1644-6223(평일 9:00 ~ 17:00)  
(팩스 02-2172-6702)
- 💻 홈페이지 : <http://www.drugsafe.or.kr>
- ✉ 이메일 : [kids\\_qna@drugsafe.or.kr](mailto:kids_qna@drugsafe.or.kr)
- 📍 (14051) 경기도 안양시 동안구 부림로  
169번길 30 5층 한국의약품안전관리원

※ 보호자가 대신하여 보고할 수 있습니다.

의약품 부작용  
보고 및 피해구제 무료상담  
**☎1644-6223**

## 인플루엔자 바이러스 치료제 (오셀타미비르 성분제제) 안전사용 길라잡이



**Q** 오셀타미비르는 어떻게 구입할 수 있나요?

**A** 오셀타미비르는 전문의약품으로 의사의 처방전이 필요하며 처방전에 따라 약국에서 구입합니다.

**Q** 오셀타미비르를 백신 대신 사용할 수 있나요?

**A** 인플루엔자 감염 예방의 일차요법은 백신요법이므로 이 약은 백신 대신 사용할 수 없습니다.  
다만, 그 해에 유행되는 균주에 대한 예방효과를 기대할 수 없거나 백신접종을 하지 못하는 경우에 한하여 고려할 수 있습니다.

**Q** 오셀타미비르를 해열진통제(이부프로펜, 아세트아미노펜, 아스피린)와 함께 복용해도 될까요?

**A** 오셀타미비르의 효과에 영향을 미치지 않으므로 함께 복용할 수 있습니다.

**Q** 오셀타미비르를 임신부나 수유부도 먹어도 되나요?

**A** 임신부, 수유부 모두 의사와 상의할 것을 권장합니다.  
제한적인 연구에서 태아에 대한 위해 작용은 나타나지 않았습니. 또한 모유로의 분비는 보고된 바 있으나 그 양이 적은 것으로 나타났습니다.





## 오셀타미비르는 어떠한 의약품인가요?

오셀타미비르(Oseltamivir)는 인플루엔자 바이러스 감염증의 치료와 예방에 사용되는 항바이러스제 의약품입니다. 인플루엔자 바이러스 표면의 뉴라미니다제(Neuraminidase)라는 효소를 억제하여 호흡기에서 인플루엔자 바이러스의 증식을 막습니다.

※ 제품: 타미플루캡슐75밀리그램(인산오셀타미비르) 등 123개 품목('17. 8. 21 기준)

## 오셀타미비르는 어떤 경우 사용하나요?

### ✓ 치료

출생 후 2주 이상 신생아(수태 후 연령이 36주 미만인 소아에는 적용되지 않음), 소아 및 성인의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 치료

### ✓ 예방

1세 이상의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 예방

※ 예방의 일차요법은 백신요법이므로 이 약은 백신 대신 사용할 수 없습니다.

## 오셀타미비르는 어떻게 복용하나요?

일반적으로 치료를 위해서는 1일 2회 5일간 복용하며, 예방을 위해서는 1일 1회 10일간 복용합니다. 증상이 나아지더라도 임의로 중단하지 말고 처방일수 만큼 계속 복용합니다.

인플루엔자 바이러스는 감염 후 72시간 내에 증식이 일어납니다. 바이러스의 증식을 억제하기 위해서는 초기 증상 발현 또는 감염자와 접촉한지 48시간 내에 약을 복용해야 최적의 치료효과를 기대할 수 있습니다.



※ 음식을 섭취와 관계없이 복용할 수 있으나, 음식과 함께 복용하면 이상사례의 가능성을 줄일 수 있습니다.

## 주의해야 할 사항이 있나요?

### 소아·청소년의 경우

이 약을 복용중인 인플루엔자 환자들 중 주로 소아·청소년 환자에서 **경련과 섬망**(의식상태의 동요와 운동성 흥분이 동반된 상태)과 같은 신경 정신계 이상반응이 나타날 수 있습니다.

그러나 이 약 투여로 인한 것인지는 알려져 있지 않고, 이 약을 복용하지 않았던 환자에서도 유사한 증상이 발현될 수 있습니다.

따라서 보호자는 적어도 2일간 아이가 혼자 있지 않도록 함께 하시고, 이상행동 발현에 대해 면밀히 관찰해야 합니다.

※ 인과관계는 불분명하지만, 10세 이상의 소아 환자에서 이 약의 복용 후 이상행동을 보이거나 추락 등의 사고에 이른 사례가 보고 되었습니다.

### 어르신의 경우

어르신의 경우 용량조절은 필요하지 않습니다. 하지만 종종 신체적 기능(신기능, 간기능 등)이 감소되고 여러 질병을 앓기 쉬우므로 주의가 필요합니다.

## 어떤 이상사례가 보고되었나요?

한국의약품안전관리원은 의약품이상사례보고시스템(Korea Adverse Event Reporting System, KAERS)을 통해 의약품 등을 투여·사용 후 발생한 부작용에 대하여 보고를 받고 있습니다.

2012~2016년 5년 간 다빈도로 보고된 오셀타미비르의 이상사례에는 아래와 같은 증상들이 있습니다.



만일 심각한 이상사례가 의심되거나 발생한다면 오셀타미비르 복용 중단 여부를 의사나 약사와 상담하세요.

